

สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (ระลอก 2)

สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มีผู้ป่วยเสียชีวิตทั่วโลกอย่างต่ำ 14,142 ราย (ณ. 30 ธ.ค.52) ทวีปอเมริกามีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ 7,094 ราย สำหรับประเทศไทย มีผู้เสียชีวิต 198 ราย ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวัง 4,398 ราย พบผู้ป่วย H1N1 2,506 ราย เสียชีวิต 6 ราย (ณ. 25 ม.ค. 53)

เดือนมกราคม 2553 ที่ผ่านมา มีการระบาดระลอก 2 อย่างชัดเจน มีผู้ป่วยมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) เพิ่มมากขึ้น มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนหลายแห่ง เช่น ในโรงเรียน 2 แห่งของอ. จอมทอง โรงเรียนในตำบลเมืองคอง อ.เชียงดาว และโรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อีกหลายโรงเรียน รวมทั้งสถานรับเลี้ยงเด็กและร้านอาหาร (ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฝ่ายวิชาการด้านควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2553) ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดและให้ความสำคัญในประเด็นดังต่อไปนี้

1. **บุคลากร** ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ สวม mask เมื่อต้องเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ล้างมือเป็นนิสัย กรณีป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดาต้องสวม mask ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ กรณีมีอาการไข้มากกว่า 38 องศา ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ เจ็บคอ ควรหยุดงานและพบแพทย์ และแจ้งข้อมูลให้ ICN ทราบเพื่อการเฝ้าระวังต่อส่วนเรื่องวัคซีน ขอเร่งรัดให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอีกประมาณ 50% รับผิดชอบการเนื่องจากหลังฉีดต้องรอประมาณ 2 สัปดาห์ร่างกายจึงสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้

2. **ผู้ป่วย** ขอให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับติดตามการปฏิบัติ ตามแนวทางการคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่งาน IC กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

3. **ดูแลความสะอาดสถานที่ทำงาน** โดยเฉพาะ เป็นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ถูกปิดประตู โทรศัพท์ราวบันได เก้าอี้ โต๊ะทำงาน กำกับติดตามให้ผู้ช่วยเหลือคนไข้ทำความสะอาดที่นอนหมอน เหยียงนอน ผู้ป่วยทุกวัน เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก